

Dérivation

Dérivabilité

Exercice 1 [01354] [Correction]

Étudier la dérivabilité des fonctions suivantes :

$$\text{a) } x \mapsto \sqrt{x^2 - x^3} \qquad \text{b) } x \mapsto (x^2 - 1) \arccos(x^2)$$

Exercice 2 [00736] [Correction]

Sur quelles parties de $\mathbb{R}$, les fonctions suivantes sont-elles continues, dérivables ?

$$\text{a) } x \mapsto x|x| \qquad \text{b) } x \mapsto \frac{x}{|x|+1}$$

Exercice 3 [00247] [Correction]

Sur quelles parties de $\mathbb{R}$, les fonctions suivantes sont-elles continues, dérivables ?

$$\text{a) } f: x \mapsto \begin{cases} x \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad \text{b) } g: x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exercice 4 [01359] [Correction]

Soit $f: [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

On définit une fonction $g: [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} f(2x) & \text{si } x \in [0; 1/2] \\ f(2x - 1) & \text{sinon} \end{cases}$$

À quelle condition(s) la fonction g est-elle dérivable ?

Exercice 5 [01360] [Correction]

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction dérivable.

Montrer que $|f|: I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en tout point où f ne s'annule pas et exprimer sa dérivée.

Calcul de dérivées

Exercice 6 [01355] [Correction]

Après avoir déterminé le domaine d'existence, calculer les dérivées des fonctions suivantes :

$$\text{a) } x \mapsto \frac{\arctan x}{x^2+1} \qquad \text{b) } x \mapsto \frac{1}{(x+1)^2} \qquad \text{c) } x \mapsto \frac{\sin x}{(\cos x+2)^4}$$

Exercice 7 [00737] [Correction]

Après avoir déterminé le domaine d'existence, calculer les dérivées des fonctions suivantes :

$$\text{a) } x \mapsto x^x \qquad \text{b) } x \mapsto (\operatorname{ch} x)^x \qquad \text{c) } x \mapsto \ln |x|$$

Exercice 8 [00249] [Correction]

Calculer les dérivées des fonctions suivantes

$$f_1(x) = \arctan(e^x), f_2(x) = \arctan(\operatorname{sh} x) \text{ et } f_3(x) = \arctan\left(\operatorname{th} \frac{x}{2}\right)$$

Qu'en déduire ?

Dérivation d'application réciproque

Exercice 9 [01367] [Correction]

Soit $f: [0; \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \sqrt{\sin x} + x$$

Justifier que f réalise une bijection vers un intervalle à préciser, puis que f^{-1} est continue et dérivable sur cet intervalle.

Application de la dérivation

Exercice 10 [01356] [Correction]

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, on considère les fonctions

$$f_\lambda: x \mapsto \frac{x + \lambda}{x^2 + 1}$$

- a) Montrer que les tangentes en 0 aux fonctions f_λ sont parallèles.
 b) Observer que les tangentes en 1 sont concourantes.

Exercice 11 [01366] [Correction]

Soit $f: [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$f(0) = -1 \text{ et } \lim_{+\infty} f = +\infty$$

Montrer que si f s'annule au moins deux fois alors f' aussi.

Exercice 12 [01365] [Correction]

Déterminer toutes les applications $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y) = f(x) + f(y)$$

Calcul de limites

Exercice 13 [01357] [Correction]

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un point de I qui n'en soit pas une extrémité. Si le rapport

$$\frac{1}{2h} (f(a + h) - f(a - h))$$

admet une limite finie quand h tend vers 0, celle-ci est appelée dérivée symétrique de f en a .

- a) Montrer que, si f est dérivable à droite et à gauche en a , elle admet une dérivée symétrique en a .
 b) Que dire de la réciproque ?

Exercice 14 [01358] [Correction]

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en $a \in \mathbb{R}$. Étudier

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(x)}{x - a}$$

Calcul de dérivées n-ième

Exercice 15 [01362] [Correction]

Calculer la dérivée n -ième de

a) $x \mapsto x^2(1 + x)^n$

b) $x \mapsto (x^2 + 1)e^x$

Exercice 16 [01361] [Correction]

Calculer la dérivée n -ième de

$$x \mapsto \frac{1}{1-x}, x \mapsto \frac{1}{1+x} \text{ puis } x \mapsto \frac{1}{1-x^2}$$

Exercice 17 [00251] [Correction]

Calculer la dérivée n -ième de

$$x \mapsto \frac{1}{1-x^2}$$

Exercice 18 [00743] [Correction]

Calculer la dérivée n -ième de $x \mapsto \cos^3 x$

Exercice 19 [03863] [Correction]

Calculons la dérivée n -ième de la fonction réelle $t \mapsto \cos(t)e^t$.

Exercice 20 [01363] [Correction]

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = e^{x\sqrt{3}} \sin x$. Montrer que

$$f^{(n)}(x) = 2^n e^{x\sqrt{3}} \sin\left(x + \frac{n\pi}{6}\right)$$

Exercice 21 [00254] [Correction]

Montrer que la dérivée d'ordre n de $x^{n-1} e^{1/x}$ est

$$(-1)^n x^{-(n+1)} e^{1/x}$$

Exercice 22 [00252] [Correction]

Soit $f: x \mapsto \arctan x$.

- a) Montrer que pour tout $n \geq 1$

$$f^{(n)}(x) = (n-1)! \cos^n(f(x)) \sin(nf(x) + n\pi/2)$$

b) En déduire les racines de $f^{(n)}$ pour $n \geq 1$.

Exercice 23 [01364] [\[Correction\]](#)

Calculer de deux façons la dérivée n -ième de $x \mapsto x^{2n}$.

En déduire une expression de

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

Théorème de Rolle

Exercice 24 [01370] [\[Correction\]](#)

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. On suppose que f' ne s'annule pas.

Montrer que f ne peut être périodique.

Exercice 25 [01371] [\[Correction\]](#)

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $x \in]0; 1[$ tel que

$$4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$$

Exercice 26 [00256] [\[Correction\]](#)

Soit $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable et vérifiant $f'(a) > 0$ et $f'(b) < 0$.

Montrer que la dérivée de f s'annule.

Exercice 27 [01372] [\[Correction\]](#)

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^n$ s'annulant en $n+1$ points distincts de I .

- Montrer que la dérivée n -ième de f s'annule au moins une fois sur I .
- Soit α un réel. Montrer que la dérivée $(n-1)$ -ième de $f' + \alpha f$ s'annule au moins une fois sur I .
(indice : on pourra introduire une fonction auxiliaire.)

Exercice 28 [00262] [\[Correction\]](#)

On pose $f: x \mapsto [(x^2 - 1)^n]^{(n)}$.

- Montrer que f est une fonction polynomiale de degré n .

b) Calculer $f(1)$ et $f(-1)$.

c) Montrer que f possède exactement n racines distinctes toutes dans $] -1; 1[$.

Exercice 29 [02820] [\[Correction\]](#)

Soient $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable sur I et a, b, c trois points distincts de I .

Montrer

$$\exists d \in I, \frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)} = \frac{1}{2}f''(d)$$

Exercice 30 [01376] [\[Correction\]](#)

Soient $n \in \mathbb{N}$, $a < b \in \mathbb{R}$ et $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction n fois dérivable.

Montrer que si

$$f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0 \text{ et } f(b) = 0$$

alors il existe $c \in]a; b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.

Exercice 31 [01373] [\[Correction\]](#)

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que

$$\lim_{-\infty} f = \lim_{+\infty} f = +\infty$$

Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 32 [01374] [\[Correction\]](#)

Soit $f: [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que

$$\lim_{+\infty} f = f(0)$$

Montrer qu'il existe $c > 0$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 33 [01377] [\[Correction\]](#)

Soit $a > 0$ et f une fonction réelle continue sur $[0; a]$ et dérivable sur $]0; a[$.

On suppose

$$f(0) = 0 \text{ et } f(a)f'(a) < 0$$

Montrer qu'il existe $c \in]0; a[$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 34 [01380] [Correction]

Soit $a > 0$ et $f: [0; a] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que

$$f(0) = f(a) = 0 \text{ et } f'(0) = 0$$

- Montrer que la dérivée de $x \mapsto f(x)/x$ s'annule sur $]0; a[$.
- En déduire qu'il existe un point autre que l'origine en lequel la tangente à f passe par l'origine.

Exercice 35 [01378] [Correction]

[Règle de L'Hôpital] Soient $f, g: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables. On suppose que

$$\forall x \in [a; b], g'(x) \neq 0$$

- Montrer que $g(a) \neq g(b)$.
- Montrer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Exercice 36 [01375] [Correction]

Soit $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable vérifiant

$$f(a) = f(b) = 0 \text{ et } f'(a) > 0, f'(b) > 0$$

Montrer qu'il existe $c_1, c_2, c_3 \in]a; b[$ tels que $c_1 < c_2 < c_3$ et

$$f'(c_1) = f'(c_2) = f'(c_3) = 0$$

Exercice 37 [03436] [Correction]

Soit $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ vérifiant

$$f(a) = f'(a) \text{ et } f(b) = f'(b)$$

Montrer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que

$$f(c) = f''(c)$$

Indice : on pourra introduire une fonction auxiliaire dépendant de $f(x)$, $f'(x)$ et e^x

Théorème des accroissements finis**Exercice 38** [01386] [Correction]

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable.

Montrer que f est lipschitzienne si, et seulement si, sa dérivée est bornée.

Exercice 39 [01381] [Correction]

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

Montrer que

$$\forall x > 0, \exists c > 0, f(x) - f(-x) = x(f'(c) + f'(-c))$$

Exercice 40 [01382] [Correction]

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a; a + 2h]$ (avec $a \in \mathbb{R}$ et $h > 0$).

Montrer

$$\exists c \in]a; a + 2h[, f(a + 2h) - 2f(a + h) + f(a) = h^2 f''(c)$$

(indice : introduire $\varphi(x) = f(x + h) - f(x)$.)

Exercice 41 [01384] [Correction]

À l'aide du théorème des accroissements finis déterminer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left((x + 1)e^{\frac{1}{x+1}} - xe^{\frac{1}{x}} \right)$$

Exercice 42 [00267] [Correction]

Montrer à l'aide du théorème des accroissements finis que

$$\sqrt{[n+1]n+1} - \sqrt{[n]n} \sim -\frac{\ln n}{n^2}$$

Exercice 43 [01385] [Correction]

Montrer que

$$\forall x > 0, \frac{1}{1+x} < \ln(1+x) - \ln(x) < \frac{1}{x}$$

En déduire, pour $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p}$$

Exercice 44 [01341] [\[Correction\]](#)

Soit $f:]0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. On suppose

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \ell \in \mathbb{R} \text{ et } xf'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \ell' \in \mathbb{R}$$

Que dire de ℓ' ?

Exercice 45 [00727] [\[Correction\]](#)

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a \in \mathbb{R}$.

- Si f'' est bornée, que dire de $f'(x)$ quand $x \rightarrow +\infty$?
- Le résultat subsiste-t-il sans l'hypothèse du a) ?

Exercice 46 [03886] [\[Correction\]](#)

Une fonction $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite höldérienne d'exposant $\alpha > 0$ s'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ vérifiant

$$\forall x, y \in I, |f(y) - f(x)| \leq M |y - x|^\alpha$$

- Soit $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$.
Montrer que f est höldérienne d'exposant $\alpha = 1$.
- Démontrer que les fonctions höldériennes d'exposant > 1 sont constantes.
- On considère la fonction $f: x \mapsto x \ln x$ définie sur $]0; 1]$.
Montrer que la fonction f n'est pas höldérienne d'exposant 1.
- Vérifier cependant que f est höldérienne d'exposant α pour tout $\alpha \in]0; 1[$.

Obtention d'inégalités**Exercice 47** [01383] [\[Correction\]](#)

Établir les inégalités suivantes :

- $\forall x \in]-1; +\infty[, \frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$
- $\forall x \in \mathbb{R}_+, e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

Exercice 48 [01402] [\[Correction\]](#)

Soit $p \in]0; 1]$.

- Établir que pour tout $t \geq 0$, on a

$$(1+t)^p \leq 1+t^p$$

- En déduire que pour tout $x, y \geq 0$,

$$(x+y)^p \leq x^p + y^p$$

Classe d'une fonction**Exercice 49** [01387] [\[Correction\]](#)

Soit $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que f est lipschitzienne.

Exercice 50 [01388] [\[Correction\]](#)

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et périodique.

Montrer que f est lipschitzienne.

Exercice 51 [01389] [\[Correction\]](#)

Montrer que la fonction $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \ln x & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 52 [01390] [\[Correction\]](#)

Soit $n \in \mathbb{N}$, montrer que la fonction

$$f_n: x \mapsto \begin{cases} x^{n+1} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 53 [01368] [\[Correction\]](#)

Soit $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que $f'(0) = 0$.

Montrer qu'il existe $g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) = g(x^2)$$

Corrections

Exercice 1 : [énoncé]

a) $f(x) = \sqrt{x^2 - x^3}$ est définie et continue sur $] -\infty ; 1]$.

Par opérations, f est dérivable sur $] -\infty ; 0[\cup] 0 ; 1[$.

Quand $h \rightarrow 0^+$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \sqrt{1 - h} \rightarrow 1$$

et quand $h \rightarrow 0^-$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} \rightarrow -1$$

f n'est pas dérivable en 0 mais y admet un nombre dérivée à droite et à gauche.

Quand $h \rightarrow 0^-$,

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{\sqrt{-h - 2h^2 - h^3}}{h} \rightarrow -\infty$$

f n'est pas dérivable en 1, il y a une tangente verticale à son graphe en cet abscisse.

b) $f(x) = (x^2 - 1) \arccos x^2$ est définie et continue sur $[-1 ; 1]$.

Par opération f est dérivable sur $] -1 ; 1[$.

Quand $h \rightarrow 0^-$,

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = (2+h) \arccos((1+h)^2) \rightarrow 0$$

f est dérivable en 1 et $f'(1) = 0$.

Par parité, f est aussi dérivable en -1 et $f'(-1) = 0$.

Exercice 2 : [énoncé]

a) $f(x) = x|x|$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Par opérations, f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Quand $h \rightarrow 0^+$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = h \rightarrow 0$$

et quand $h \rightarrow 0^-$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = -h \rightarrow 0$$

f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

b) $f(x) = \frac{x}{|x|+1}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Par opérations f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Quand $h \rightarrow 0$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{1}{|h|+1} \rightarrow 1$$

donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 1$.

Exercice 3 : [énoncé]

a) f est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Par opérations, f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Quand $h \rightarrow 0$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \sin\left(\frac{1}{h}\right)$$

n'a pas de limite. La fonction f n'est pas dérivable en 0.

b) g est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Par opérations, g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Quand $h \rightarrow 0$,

$$\frac{g(h) - g(0)}{h} = h \sin\left(\frac{1}{h}\right) \rightarrow 0$$

La fonction g est dérivable en 0 et $g'(0) = 0$.

Exercice 4 : [énoncé]

g est dérivable sur $[0 ; 1/2[$ et $] 1/2 ; 1]$.

g est continue en $1/2$ si, et seulement si, $f(1) = f(0)$.

Si tel est le cas,

$$g'_g(1/2) = 2f'(1) \text{ et } g'_d(1/2) = 2f'(0)$$

Finalement g est dérivable si, et seulement si,

$$f(0) = f(1) \text{ et } f'(0) = f'(1)$$

Exercice 5 : [énoncé]

$|f(t)| = \sqrt{f(t)\overline{f(t)}}$ est dérivable par opérations en tout $t \in I$ tel que $f(t) \neq 0$.

$$|f(t)|' = \frac{(f(t)\overline{f(t)})'}{2\sqrt{f(t)\overline{f(t)}}} = \frac{f'(t)\overline{f(t)} + f(t)\overline{f'(t)}}{2|f(t)|} = \frac{\operatorname{Re}(f'(t)\overline{f(t)})}{|f(t)|}$$

Exercice 6 : [énoncé]

- a)
- $x \mapsto \frac{\arctan x}{x^2+1}$
- est définie et dérivable sur
- $\mathbb{R}$
- ,

$$\left(\frac{\arctan x}{x^2+1}\right)' = \frac{1-2x \arctan x}{(x^2+1)^2}$$

- b)
- $x \mapsto \frac{1}{(x+1)^2}$
- est définie et dérivable sur
- $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$
- ,

$$\left(\frac{1}{(x+1)^2}\right)' = \frac{-2}{(x+1)^3}$$

- c)
- $x \mapsto \frac{\sin x}{(\cos x+2)^4}$
- est définie et dérivable sur
- $\mathbb{R}$
- ,

$$\left(\frac{\sin x}{(\cos x+2)^4}\right)' = \frac{\cos x}{(\cos x+2)^4} + \frac{4 \sin^2 x}{(\cos x+2)^5} = \frac{4+2 \cos x-3 \cos^2 x}{(\cos x+2)^5}$$

Exercice 7 : [énoncé]

- a)
- $x \mapsto x^x$
- est définie et dérivable sur
- $\mathbb{R}_+^*$
- ,

$$(x^x)' = (e^{x \ln x})' = (1 + \ln x)x^x$$

- b)
- $x \mapsto (\operatorname{ch} x)^x$
- est définie et dérivable sur
- $\mathbb{R}$
- ,

$$((\operatorname{ch} x)^x)' = (e^{x \ln \operatorname{ch} x})' = (\ln \operatorname{ch} x + x \operatorname{th} x)(\operatorname{ch} x)^x$$

- c)
- $x \mapsto \ln |x|$
- est définie et dérivable sur
- $\mathbb{R}^*$
- ,

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$$

Exercice 8 : [énoncé]

$$f_1'(x) = \frac{e^x}{1+e^{2x}}, f_2'(x) = \frac{2e^x}{1+e^{2x}} \text{ et } f_3'(x) = \frac{e^x}{1+e^{2x}}$$

On en déduit

$$f_1(x) = \frac{1}{2}f_2(x) + \frac{\pi}{4} = f_3(x) + \frac{\pi}{4}$$

Exercice 9 : [énoncé]

f est continue et strictement croissante, $f(0) = 0$ et $f(\pi/2) = 1 + \pi/2$ donc f réalise une bijection de $[0; \pi/2]$ vers $[0; 1 + \pi/2]$ et son application réciproque f^{-1} est continue.

f est dérivable sur $]0; \pi/2]$ avec

$$f'(x) = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}} + 1 > 0$$

donc f^{-1} est dérivable sur $f(]0; \pi/2]) =]0; 1 + \pi/2]$.

Étude de la dérivabilité de f^{-1} en 0

Quand $h \rightarrow 0^+$, en posant $x = f^{-1}(h) \rightarrow 0$

$$\frac{f^{-1}(h) - f^{-1}(0)}{h} = \frac{x}{f(x)}$$

Or

$$\frac{x}{f(x)} = \frac{x}{\sqrt{\sin x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x} + o(\sqrt{x}) + x} \sim \sqrt{x} \rightarrow 0$$

donc f^{-1} est dérivable en 0 et $(f^{-1})'(0) = 0$.

Exercice 10 : [énoncé]

f_λ est dérivable et

$$f'_\lambda(x) = \frac{-x^2 - 2x\lambda + 1}{(x^2+1)^2}$$

- a) Pour tout
- $\lambda \in \mathbb{R}$
- , on a
- $f'_\lambda(0) = 1$
- donc les tangentes en 0 sont parallèles.

- b) L'équation de la tangente en 1 à
- f_λ
- est

$$y = -\frac{\lambda}{2}(x-1) + \frac{\lambda+1}{2}$$

ou encore

$$y = -\frac{\lambda}{2}(x-2) + \frac{1}{2}$$

Ces tangentes concourent au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 1/2.

Exercice 11 : [énoncé]

Si f' ne s'annule pas alors f est strictement croissante donc injective. Elle ne s'annule alors qu'une fois.

Si f' ne s'annule qu'une fois alors le tableau de signe de f' est de la forme

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	0	- 0 +	

ou

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	0	+ 0 +	

et le tableau de variation de f est

x	0	α	$+\infty$
$f(x)$	-1	$\searrow$ $f(\alpha)$ $\nearrow$	$+\infty$

 ou

x	0	α	$+\infty$
$f(x)$	-1	$\nearrow$ $f(\alpha)$ $\nearrow$	$+\infty$

La fonction f ne peut donc s'annuler qu'une fois.

Exercice 12 : [énoncé]

Soit f solution. En dérivant la relation par rapport à x , on obtient :

$$f'(x+y) = f'(x)$$

La fonction f est donc de dérivée constante et par suite f est affine.

De plus la relation $f(0+0) = f(0) + f(0)$ entraîne $f(0) = 0$ et donc f est linéaire.

Inversement : ok.

Exercice 13 : [énoncé]

a) Si $f'_d(a)$ et $f'_g(a)$ existent alors

$$\frac{1}{2h} (f(a+h) - f(a-h)) = \frac{1}{2h} (f(a+h) - f(a)) + \frac{1}{-2h} (f(a-h) - f(a))$$

et donc

$$\frac{1}{2h} (f(a+h) - f(a-h)) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{1}{2} (f'_d(a) + f'_g(a))$$

b) Pour $f(x) = \sqrt{|x|}$, la dérivée symétrique en 0 existe alors que la fonction n'y est pas dérivable ni à droite, ni à gauche.

Exercice 14 : [énoncé]

Quand $x \rightarrow a$,

$$\frac{xf(a) - af(x)}{x-a} = \frac{(x-a)f(a) + a(f(a) - f(x))}{x-a} \rightarrow f(a) - af'(a)$$

Exercice 15 : [énoncé]

On exploite la formule de Leibniz

a)

$$(x^2(1+x)^n)^{(n)} = \binom{n}{0} x^2 ((1+x)^n)^{(n)} + \binom{n}{1} (x^2)' ((1+x)^n)^{(n-1)} + \binom{n}{2} (x^2)'' ((1+x)^n)^{(n-2)}$$

donc

$$(x^2(1+x)^n)^{(n)} = n!x^2 + 2n.n!x(1+x) + n(n-1)\frac{n!}{2}(1+x)^2$$

b)

$$((x^2+1)e^x)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^2+1)^{(k)} (e^x)^{(n-k)} = (x^2+2nx+n(n-1)+1)e^x$$

Exercice 16 : [énoncé]

En calculant les dérivées successives

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, \left(\frac{1}{1-x}\right)'' = \left(\frac{1}{(1-x)^2}\right)' = \frac{2}{(1-x)^3}$$

on montre par récurrence

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$$

De même, mais en gérant de plus un signe

$$\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(1+x)^{n+1}}$$

Enfin

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2} \frac{1}{1-x} + \frac{1}{2} \frac{1}{1+x}$$

donc

$$\left(\frac{1}{1-x^2}\right)^{(n)} = \frac{n!}{2(1-x)^{n+1}} + \frac{(-1)^n n!}{2(1+x)^{n+1}}$$

Exercice 17 : [énoncé]

Par décomposition en éléments simples

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2} \frac{1}{1-x} + \frac{1}{2} \frac{1}{1+x}$$

Or

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}} \text{ et } \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(1+x)^{n+1}}$$

donc

$$\left(\frac{1}{1-x^2}\right)^{(n)} = \frac{n!}{2(1-x)^{n+1}} + \frac{(-1)^n n!}{2(1+x)^{n+1}}$$

Exercice 18 : [énoncé]

a) On a

$$\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

donc on peut linéariser

$$\cos^3 x = \frac{1}{4} (3 \cos x + \cos 3x)$$

On sait

$$(\cos x)^{(n)} = \cos(x + n\pi/2) \text{ et } (\cos 3x)^{(n)} = 3^n \cos(3x + n\pi/2)$$

et on obtient donc

$$(\cos^3 x)^{(n)} = \frac{1}{4} (3 \cos(x + n\pi/2) + 3^n \cos(3x + n\pi/2))$$

Exercice 19 : [énoncé]

On peut écrire

$$\cos(t)e^t = \operatorname{Re} \left(e^{(1+i)t} \right)$$

et donc

$$(\cos(t)e^t)^{(n)} = \left(\operatorname{Re}(e^{(1+i)t}) \right)^{(n)} = \operatorname{Re} \left((1+i)^n e^{(1+i)t} \right)$$

Or $(1+i)^n = 2^{n/2} e^{in\pi/4}$ puis

$$(\cos(t)e^t)^{(n)} = 2^{n/2} e^t \cos(t + n\pi/4)$$

Exercice 20 : [énoncé]

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Pour $n = 0$: ok

Supposons la propriété établie au rang $n \geq 0$.

$$f^{(n+1)}(x) = \left(2^n e^{x\sqrt{3}} \sin \left(x + \frac{n\pi}{6} \right) \right)'$$

donc

$$f^{(n+1)}(x) = 2^n \left(\sqrt{3} \sin \left(x + \frac{n\pi}{6} \right) + \cos \left(x + \frac{n\pi}{6} \right) \right) e^{x\sqrt{3}}$$

puis

$$f^{(n+1)}(x) = 2^{n+1} \sin \left(x + \frac{(n+1)\pi}{6} \right) e^{x\sqrt{3}}$$

Récurrence établie.

On peut aussi écrire

$$f(x) = e^{x\sqrt{3}} \sin x = \operatorname{Im} \left(e^{(\sqrt{3}+i)x} \right)$$

et exploiter ceci pour calculer directement la dérivée d'ordre n .

Exercice 21 : [énoncé]

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Pour $n = 0$: ok.

Supposons la propriété établie au rang $n \geq 0$.

$$\left(x^n e^{1/x} \right)^{(n+1)} = \left(x \cdot x^{n-1} e^{1/x} \right)^{(n+1)} = x \left(x^{n-1} e^{1/x} \right)^{(n+1)} + (n+1) \left(x^{n-1} e^{1/x} \right)^{(n)}$$

donc

$$\left(x^n e^{1/x} \right)^{(n+1)} = x \left((-1)^n x^{-(n+1)} e^{1/x} \right)' + (n+1) (-1)^n x^{-(n+1)} e^{1/x}$$

ce qui donne

$$\left(x^n e^{1/x} \right)^{(n+1)} = (-1)^{n+1} x^{-(n+2)} e^{1/x}$$

Récurrence établie.

Exercice 22 : [énoncé]

a) Par récurrence sur $n \geq 1$.

Pour $n = 1$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \text{ et}$$

$$\cos(f(x)) \sin(f(x) + \pi/2) = \cos^2(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Supposons la propriété vérifiée au rang $n \geq 1$

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{n!}{1+x^2} \left[\begin{array}{l} -\sin(f(x)) \sin(nf(x) + n\pi/2) \\ + \cos(nf(x) + n\pi/2) \cos(f(x)) \end{array} \right] \cos^{n-1}(f(x))$$

Or

$$\frac{1}{1+x^2} = \cos^2(f(x))$$

donc

$$f^{(n+1)}(x) = n! \left[\begin{array}{l} \sin(f(x)) \cos(nf(x) + (n+1)\pi/2) \\ + \sin(nf(x) + (n+1)\pi/2) \cos(f(x)) \end{array} \right] \cos^{n+1}(f(x))$$

puis

$$f^{(n+1)}(x) = n! \sin((n+1)f(x) + (n+1)\pi/2) \cos^{n+1}(f(x))$$

Récurrence établie.

b) Puisque $\arctan x \in]-\pi/2; \pi/2[$, $\cos(f(x)) \neq 0$.

Par suite

$$f^{(n)}(x) = 0 \iff \sin(nf(x) + n\pi/2) = 0$$

et donc

$$f^{(n)}(x) = 0 \iff f(x) = \frac{k\pi}{n} - \frac{\pi}{2} \text{ avec } k \in \{1, \dots, n-1\}$$

Au final, les racines de $f^{(n)}$ sont les

$$\cot \frac{k\pi}{n} \text{ avec } k \in \{1, \dots, n-1\}$$

Exercice 23 : [énoncé]

D'une part

$$(x^{2n})^{(n)} = \frac{(2n)!}{n!} x^n$$

D'autre part

$$(x^{2n})^{(n)} = (x^n \times x^n)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^n)^{(k)} (x^n)^{(n-k)}$$

et donc

$$(x^{2n})^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{n!}{k!} x^n = n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 x^n$$

On en déduit

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \binom{2n}{n}$$

Exercice 24 : [énoncé]

Si f est T -périodique avec $T > 0$ alors en appliquant le théorème de Rolle entre par exemple 0 et T , la dérivée de f s'annule.

Exercice 25 : [énoncé]

Soit $\varphi: [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\varphi(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - (a+b+c)x$$

φ est dérivable et $\varphi(0) = 0 = \varphi(1)$. Il suffit d'appliquer le théorème de Rolle pour conclure.

Exercice 26 : [énoncé]

f admet un maximum sur $[a; b]$ qui ne peut être ni en a , ni en b : la dérivée de f s'y annule.

Exercice 27 : [énoncé]

a) Notons $a_0 < a_1 < \dots < a_n$ les $n+1$ points où nous savons que f s'annule.

Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on peut appliquer le théorème de Rolle à f sur $[a_{i-1}; a_i]$.

En effet f est continue sur $[a_{i-1}; a_i]$, dérivable sur $]a_{i-1}; a_i[$ et

$$f(a_{i-1}) = 0 = f(a_i).$$

Par le théorème de Rolle, il existe $b_i \in]a_{i-1}; a_i[$ tel que $f'(b_i) = 0$.

Puisque $b_1 < a_1 < b_2 < \dots < a_{n-1} < b_n$, les $b_1, \dots, b_n$ sont deux à deux distincts.

Ainsi f' s'annule au moins n fois.

De même, f'' s'annule au moins $n - 1$ fois et ainsi de suite jusqu'à $f^{(n)}$ s'annule au moins une fois.

- b) Considérons $g(x) = f(x)e^{\alpha x}$. g s'annule $n + 1$ fois donc g' s'annule au moins n fois.

Or $g'(x) = (f'(x) + \alpha f(x))e^{\alpha x}$ donc les annulations de g' sont les annulations de $f' + \alpha f$.

Puisque $f' + \alpha f$ s'annule n fois, la dérivée $(n - 1)$ -ième de $f' + \alpha f$ s'annule au moins une fois.

Exercice 28 : [énoncé]

- a) $(X^2 - 1)^n$ est de degré $2n$ donc $[(X^2 - 1)^n]^{(n)}$ est de degré n .

- b) Introduisons $g: x \mapsto (x^2 - 1)^n$ de sorte que $f = g^{(n)}$

Quand $x \rightarrow 1$ On a

$$g(x) = (x + 1)^n(x - 1)^n = 2^n(x - 1)^n + o((x - 1)^n)$$

Par la formule de Taylor-Young, on a parallèlement

$$g(x) = \frac{g^{(n)}(1)}{n!}(x - 1)^n + o((x - 1)^n)$$

donc

$$f(1) = g^{(n)}(1) = 2^n n!$$

et de manière similaire

$$f(-1) = (-1)^n 2^n n!$$

- c) 1 et -1 sont racines de multiplicité n de $g: x \mapsto (x^2 - 1)^n$, 1 et -1 sont donc racines de $g, g', \dots, g^{(n-1)}$.

En appliquant le théorème de Rolle, on montre que $g', g'', \dots, g^{(n)} = f$ admettent resp. $1, 2, \dots, n$ racines dans $]-1; 1[$. Puisque f est de degré n , celles-ci sont simples et il ne peut y en avoir d'autres.

Exercice 29 : [énoncé]

Considérons

$$g: x \mapsto (x - b)f(a) + (a - x)f(b) + (b - a)f(x) - \frac{1}{2}(a - b)(b - x)(x - a)K$$

où la constante K est choisie de sorte que $g(c) = 0$ (ce qui est possible).

La fonction g s'annule en a , en b et en c donc par le théorème de Rolle, il existe $d \in I$ tel que $g''(d) = 0$ ce qui résout le problème posé.

Exercice 30 : [énoncé]

En appliquant le théorème de Rolle à f entre a et b : il existe $c_1 \in]a; b[$ tel que $f'(c_1) = 0$.

En appliquant le théorème de Rolle à f' entre a et c_1 : il existe $c_2 \in]a; c_1[$ tel que $f''(c_2) = 0$.

...

En appliquant le théorème de Rolle à $f^{(n-1)}$ entre a et c_{n-1} : il existe $c_n \in]a; c_{n-1}[$ tel que $f^{(n)}(c_n) = 0$.

$c = c_n$ résout le problème.

Exercice 31 : [énoncé]

Puisque $\lim_{-\infty} f = +\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$, il existe $a < 0$ et $b > 0$ tels que

$$f(a) > f(0) + 1 \text{ et } f(b) > f(0) + 1$$

En appliquant le théorème des valeurs intermédiaires entre a et 0, d'une part, et 0 et b d'autre part, il existe $\alpha \in]a; 0[$ et $\beta \in]0; b[$ tels que $f(\alpha) = f(0) + 1 = f(\beta)$.

En appliquant le théorème de Rolle entre α et β , il existe $c \in]\alpha; \beta[\subset \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 32 : [énoncé]

Si f est constante, la propriété est immédiate.

Sinon, il existe $x_0 \in]0; +\infty[$ tel que $f(x_0) \neq f(0)$.

Posons $y = \frac{1}{2}(f(x_0) + f(0))$ qui est une valeur intermédiaire à $f(0)$ et $f(x_0)$.

Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $a \in]0; x_0[$ tel que $f(a) = y$.

Puisque $\lim_{+\infty} f = f(0)$, y est une valeur intermédiaire à $f(x_0)$ et une valeur $f(x_1)$ avec x_1 suffisamment grand. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $b \in]x_0; x_1[$ tel que $f(b) = y$.

En appliquant le théorème de Rolle sur $[a; b]$, on peut alors conclure.

Exercice 33 : [énoncé]

Quitte à considérer $-f$, on peut supposer $f(a) > 0$ et $f'(a) < 0$.

Puisque $f'(a) < 0$, il existe $b \in]0; a[$ tel que $f(b) > f(a)$.

En appliquant le théorème de valeurs intermédiaires entre 0 et b , il existe $\alpha \in]0; b[$ tel que $f(\alpha) = f(a)$.

En appliquant le théorème de Rolle entre α et a , on obtient $c \in]\alpha; a[\subset]0; a[$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 34 : [énoncé]

- a) La fonction $g: x \mapsto f(x)/x$ est définie, continue et dérivable sur $]0; a[$.
Quand $x \rightarrow 0$,

$$g(x) \rightarrow f'(0) = 0$$

Prolongeons g par continuité en 0 en posant $g(0) = 0$.

Puisque g est continue sur $[0; a]$, dérivable sur $]0; a[$ et puisque $g(0) = g(a)$, le théorème de Rolle assure l'annulation de la dérivée de g en un point $c \in]0; a[$.

- b)

$$g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$$

donc $g'(c) = 0$ donne $cf'(c) = f(c)$.

La tangente à f en c a pour équation :

$$y = f'(c)(x - c) + f(c) = f'(c)x$$

Elle passe par l'origine.

Exercice 35 : [énoncé]

- a) Si $g(a) = g(b)$ alors on peut appliquer le théorème de Rolle et contredire l'hypothèse

$$\forall x \in [a; b], g'(x) \neq 0$$

- b) Soit

$$h: x \mapsto g(x)(f(b) - f(a)) - f(x)(g(b) - g(a))$$

h est continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$,

$$h(a) = g(a)f(b) - g(b)f(a) = h(b)$$

En vertu du théorème de Rolle, la dérivée de h s'annule et cela résout le problème posé.

Exercice 36 : [énoncé]

Puisque $f(a) = 0$ et $f'(a) > 0$, il existe $x_1 \in]a; b[$ tel que $f(x_1) > 0$.

En effet, si pour tout $x_1 \in]a; b[$, $f(x_1) \leq 0$ alors quand $h \rightarrow 0^+$, $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0$ et donc $f'(a) \leq 0$.

De même, puisque $f(b) = 0$ et $f'(b) > 0$, il existe $x_2 \in]a; b[$ tel que $f(x_2) < 0$.

Puisque f prend une valeur positive et une valeur négative dans $]a; b[$, par le théorème des valeurs intermédiaires, f s'y annule.

Ainsi il existe $c_2 \in]a; b[$ tel que $f(c_2) = 0$.

En appliquant le théorème de Rolle sur $[a; c_2]$ et $[c_2; b]$, on obtient c_1 et c_3 .

Exercice 37 : [énoncé]

Introduisons $\varphi: x \mapsto (f(x) - f'(x))e^x$.

La fonction φ est définie et continue sur $[a; b]$, φ est dérivable sur $]a; b[$ et $\varphi(a) = 0 = \varphi(b)$.

Par le théorème de Rolle, on peut affirmer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que

$$\varphi'(c) = 0$$

Or

$$\varphi'(x) = (f(x) - f''(x))e^x$$

donc $\varphi'(c) = 0$ donne

$$f(c) = f''(c)$$

Exercice 38 : [énoncé]

($\Leftarrow$) En vertu de l'inégalité des accroissements finis.

($\Rightarrow$) Si f est k lipschitzienne alors $\forall x, y \in I$ tels que $x \neq y$ on a $\left| \frac{f(x)-f(y)}{x-y} \right| \leq k$.

À la limite quand $y \rightarrow x$ on obtient $|f'(x)| \leq k$. Par suite f' est bornée.

Exercice 39 : [énoncé]

Soit $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$g(x) = f(x) - f(-x)$$

g est dérivable et $g(0) = 0$. Par le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]0; x[$ tel que

$$g(x) - g(0) = xg'(c)$$

ce qui résout notre problème.

Exercice 40 : [énoncé]

La fonction φ proposée est définie et de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a; a+h]$.

$$f(a+2h) - 2f(a+h) + f(a) = \varphi(a+h) - \varphi(a)$$

Par le théorème des accroissements finis appliqué à φ entre a et $a+h$, il existe $b \in]a; a+h[$ tel que

$$\varphi(a+h) - \varphi(a) = h\varphi'(b) = h(f'(b+h) - f'(b))$$

Par le théorème des accroissements finis appliqué à f' entre b et $b+h$, il existe $c \in]b; b+h[\subset]a; a+2h[$ tel que

$$f'(b+h) - f'(b) = hf''(c) \text{ puis } f(a+2h) - 2f(a+h) + f(a) = h^2 f''(c)$$

Exercice 41 : [énoncé]

Par le théorème des accroissements finis appliqué à la fonction $x \mapsto xe^{1/x}$ entre x et $x+1$:

il existe $c_x \in]x; x+1[$ tel que

$$(x+1)e^{1/(x+1)} - xe^{1/x} = \left(\frac{c_x-1}{c_x}\right) e^{\frac{1}{c_x}} (x+1-x) = \left(\frac{c_x-1}{c_x}\right) e^{\frac{1}{c_x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $c_x \rightarrow +\infty$ car $c_x \geq x$.

Par suite

$$\left(\frac{c_x-1}{c_x}\right) e^{\frac{1}{c_x}} \rightarrow 1$$

et donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left((x+1)e^{\frac{1}{x+1}} - xe^{\frac{1}{x}} \right) = 1$$

Exercice 42 : [énoncé]

En appliquant le théorème des accroissements finis à $x \mapsto x^{1/c}$ entre n et $n+1$, on obtient

$$\sqrt[n+1]{n+1} - \sqrt[n]{n} = \frac{1 - \ln c}{c^2} c^{1/c}$$

avec $c \in]n; n+1[$.

Puisque $c \sim n \rightarrow +\infty$, $\ln c \sim \ln n$ et puisque $c^{1/c} \rightarrow 1$

$$\sqrt[n+1]{n+1} - \sqrt[n]{n} \sim -\frac{\ln n}{n^2}$$

Exercice 43 : [énoncé]

On applique le théorème des accroissements finis à $x \mapsto \ln x$ entre x et $x+1$.

Il existe $c \in]x; x+1[$ tel que

$$\ln(1+x) - \ln x = \frac{1}{c}$$

Or $x < c < x+1$ donne

$$\frac{1}{x+1} < \frac{1}{c} < \frac{1}{x}$$

puis l'encadrement voulu.

$$\sum_{p=n+1}^{kn} \ln(p+1) - \ln p \leq \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p} \leq \sum_{p=n+1}^{kn} \ln p - \ln(p-1)$$

donne

$$\ln \frac{kn+1}{n+1} \leq \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p} \leq \ln k$$

Par le théorème des gendarmes

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p} = \ln k$$

Exercice 44 : [énoncé]

Posons $g :]0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(x) = xf(x)$. Puisque la fonction f admet une limite finie en 0^+ , on peut prolonger g par continuité en posant $g(0) = 0$. La fonction g est dérivable sur $]0; 1]$ avec $g'(x) = f(x) + xf'(x)$. Puisque g est continue en 0 et que

$$g'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \ell + \ell'$$

la fonction g est dérivable en 0 avec $g'(0) = \ell + \ell'$

Mais alors

$$\frac{g(x)}{x} = f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \ell \text{ et } \frac{g(x)}{x} = \frac{g(x) - g(0)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} g'(0) = \ell + \ell'$$

On en déduit $\ell' = 0$

Exercice 45 : [énoncé]

- a) Posons $M \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $|f''(x)| \leq M$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$.
Soit $\varepsilon > 0$. La suite (x_n) de terme général

$$x_n = n \frac{\varepsilon}{M}$$

diverge vers $+\infty$ et donc

$$f(x_{n+1}) - f(x_n) \rightarrow 0$$

Par suite il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$

$$|f(x_{n+1}) - f(x_n)| \leq \frac{\varepsilon^2}{M}$$

Par le théorème des accroissements finis, il existe $c_n \in]x_n; x_{n+1}[$ tel que

$$|f'(c_n)| (x_{n+1} - x_n) \leq \frac{\varepsilon^2}{M}$$

ce qui donne

$$|f'(c_n)| \leq \varepsilon$$

Puisque f'' est bornée par M , la fonction f' est M -lipschitzienne et donc

$$\forall u \in [x_n; x_{n+1}], |f'(u) - f'(c_n)| \leq M |u - c_n| \leq \varepsilon$$

puis

$$\forall u \in [x_n; x_{n+1}], |f'(u)| \leq \varepsilon + |f'(c_n)| \leq 2\varepsilon$$

et, puisque ceci vaut pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a en posant $A = x_N$,

$$\forall u \geq A, |f'(u)| \leq 2\varepsilon$$

On peut conclure que f' converge vers 0 en $+\infty$.

- b) Posons

$$f(t) = \frac{\cos(t^2)}{t+1}$$

On vérifie aisément que f est de classe $\mathcal{C}^2$ et converge en $+\infty$ sans que f' converge en 0.

- a) La fonction f' est continue sur le segment $[a; b]$ donc bornée. En introduisant

$$M = \sup_{t \in [a; b]} |f'(t)|$$

l'inégalité des accroissements finis donne

$$\forall x, y \in I, |f(y) - f(x)| \leq M |y - x|$$

- b) Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ höldérienne d'exposant $\alpha > 1$. Pour $x \in I$

$$\left| \frac{1}{h} (f(x+h) - f(x)) \right| \leq M |h|^{\alpha-1} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

La fonction f est donc dérivable et sa dérivée est nulle. C'est donc une fonction constante.

- c) Par l'absurde, supposons f höldérienne d'exposant 1. Il existe alors $M \in \mathbb{R}_+$ vérifiant

$$\forall x, y \in]0; 1], |f(y) - f(x)| \leq M |y - x|$$

Pour $y = 2x$, on obtient

$$\forall x \in]0; 1/2], |x \ln x + 2x \ln 2| \leq Mx$$

puis

$$\forall x \in]0; 1/2], |\ln x + 2 \ln 2| \leq M$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, on obtient une absurdité.

- d) Soit $\alpha \in]0; 1[$ et $x, y > 0$. Quitte à échanger, on peut supposer $x < y$. On peut écrire

$$y \ln y - x \ln x = (y - x) \ln y + x \ln \left(1 + \frac{y - x}{x} \right)$$

Or, on sait $\ln(1 + u) \leq u$ pour tout $u > -1$ donc

$$|y \ln y - x \ln x| \leq (y - x)(|\ln y| + 1)$$

puis

$$\frac{|y \ln y - x \ln x|}{|y - x|^\alpha} = (y - x)^{1-\alpha} (1 + |\ln y|)$$

Puisque $0 < y - x \leq y$ et $1 - \alpha \geq 0$, on obtient encore

$$\frac{|y \ln y - x \ln x|}{|y - x|^\alpha} = y^{1-\alpha} (1 + |\ln y|)$$

Exercice 46 : [énoncé](#)

Considérons maintenant la fonction

$$y \mapsto y^{1-\alpha} (1 + |\ln y|)$$

Cette fonction est continue sur $]0; 1]$ et se prolonge par continuité en 0 par la valeur 0 car $1 - \alpha > 0$. Cette fonction est donc bornée et l'on peut introduire $M \in \mathbb{R}_+$ vérifiant

$$\forall y \in]0; 1], y^{1-\alpha} (1 + |\ln y|) \leq M$$

On obtient alors

$$\forall x, y \in]0; 1], |f(y) - f(x)| \leq M |y - x|^\alpha$$

Exercice 47 : [énoncé]

- a) Soit $f: x \mapsto x - \ln(1+x)$ définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1; +\infty[$.

$$f'(x) = \frac{x}{1+x}$$

Le tableau des variations de f est alors

x	-1	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$ 0 $\nearrow$	$+\infty$

On en déduit que f est positive.

Soit $g: x \mapsto \ln(1+x) - x/(1+x)$ définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1; +\infty[$.

$$g'(x) = \frac{x}{(1+x)^2}$$

Le tableau des variations de g est alors

x	-1	0	$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$ 0 $\nearrow$	$+\infty$

On en déduit que g est positive.

- b) Soit $f: x \mapsto e^x - 1 - x - \frac{1}{2}x^2$ définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+$.

$$f'''(x) = e^x \geq 0$$

On obtient les variations suivantes

x	0	$+\infty$
$f''(x)$	0 $\nearrow$	$+\infty$
$f'(x)$	0 $\nearrow$	$+\infty$
$f(x)$	0 $\nearrow$	$+\infty$

On en déduit que f est positive.

Exercice 48 : [énoncé]

- a) Étudions la fonction $\delta: t \mapsto 1 + t^p - (1+t)^p$ définie continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

On a $\delta(0) = 0$ et pour $t > 0$,

$$\delta'(t) = p(t^{p-1} - (1+t)^{p-1})$$

Puisque $p-1 \leq 0$, $t^{p-1} \geq (1+t)^{p-1}$ et donc $\delta'(t) \geq 0$. On en déduit que pour tout $t \geq 0$, $\delta(t) \geq 0$ puis l'inégalité demandée.

- b) Pour $x = 0$, l'inégalité est immédiate et pour $x > 0$,

$$(x+y)^p = x^p \left(1 + \frac{y}{x}\right)^p \leq x^p \left(1 + \left(\frac{y}{x}\right)^p\right) = x^p + y^p$$

Exercice 49 : [énoncé]

f' est continue sur le segment $[a; b]$ elle y est donc bornée par un certain M . Par l'inégalité des accroissements finis, f est M lipschitzienne.

Exercice 50 : [énoncé]

La dérivée de f est continue et périodique donc bornée par son max sur une période (qui existe par continuité sur un segment). Par l'inégalité des accroissements finis, il en découle que f est lipschitzienne.

Exercice 51 : [énoncé]

f est continue sur $\mathbb{R}_+$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0; +\infty[$.

Pour $x > 0$, $f'(x) = 2x \ln x + x$.

Quand $x \rightarrow 0^+$, $f'(x) \rightarrow 0$ donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

De plus, f' est continue en 0 et finalement f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 52 : [énoncé]

Procédons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Pour $n = 0$, la fonction considérée est continue.

Supposons la propriété établie au rang $n \geq 0$.

f_{n+1} est continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Pour $x \neq 0$, $f'_{n+1}(x) = (n+2)f_n(x)$.

Quand $x \rightarrow 0$, $f'_{n+1}(x) \rightarrow 0 = (n+2)f_n(0)$ donc f_{n+1} est dérivable en 0 et $f'_{n+1}(0) = 0$.

Ainsi f_{n+1} est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'_{n+1} = (n+2)f_n$.

Par hypothèse de récurrence, f_n est de classe $\mathcal{C}^n$ et donc f_{n+1} est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$.

Récurrence établie.

Exercice 53 : [\[énoncé\]](#)

Posons $g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(t) = f(\sqrt{t})$$

Par composition g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et

$$\forall x > 0, g'(t) = \frac{f'(\sqrt{t})}{2\sqrt{t}}$$

g est continue et

$$g'(t) = \frac{f'(\sqrt{t}) - f'(0)}{2\sqrt{t}} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{f''(0)}{2}$$

donc g est dérivable et g' est continue en 0.

Ainsi g est de classe $\mathcal{C}^1$.