

Partie I

1) $x \in]0, 2\pi[$.

$$\begin{aligned} B_n(x) &= \sum_{k=1}^n \sin(kx) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Im}(e^{ikx}) \\ &= \operatorname{Im} \left(\frac{e^{ix}(1-e^{inx})}{1-e^{ix}} \right) \\ &= \operatorname{Im} \left(\frac{e^{i(x+n\pi/2)} - e^{ix}}{e^{ix/2}(e^{ix/2} - e^{-ix/2})} \right) \\ &= \operatorname{Im} \left(e^{i(\frac{n+1}{2})x} \frac{\sin n\frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right) \\ &= \frac{\sin(n+1)\frac{x}{2} \sin n\frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \\ &= \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos(2n+1)\frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \end{aligned}$$

b) On a $B_k(x) = \sum_{k=1}^n \sin kx \Rightarrow$
 $\sin(kx) = B_k(x) - B_{k-1}(x)$.

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k^\alpha} = \sum_{k=1}^n \frac{B_k(x) - B_{k-1}(x)}{k^\alpha}$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{B_k(x)}{k^\alpha} - \sum_{k=1}^n \frac{B_{k-1}(x)}{k^\alpha}$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{B_k(x)}{k^\alpha} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{B_k(x)}{(k+1)^\alpha}$$

$$= \sum_{k=1}^{n-1} B_k(x) \left(\frac{1}{k^\alpha} - \frac{1}{(k+1)^\alpha} \right) + \frac{B_n(x)}{n^\alpha} + B_0(x)$$

Correction devoir n°1 "2024"

c) On a $|B_n(x)| \leq \frac{2}{2 \sin \frac{x}{2}}$ (d'après a)

$$\Rightarrow |B_n(x) \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right)| \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \left| \frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right|$$

$$\leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right)$$

or $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$ ($\alpha > 0$) $\Rightarrow$

$$\sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) \text{ C.V.} \Rightarrow \sum_{n \geq 1} B_n(x) \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) \text{ est abs C.V.}$$

d) $(B_n(x))_{n \geq 1}$ est une suite bornée.

et $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{B_n(x)}{n^\alpha} = 0$

$\cdot \sum_{n \geq 1} B_n(x) \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right)$ est abs C.V. $\Rightarrow$ C.V.

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} B_k(x) \left(\frac{1}{k^\alpha} - \frac{1}{(k+1)^\alpha} \right) \text{ est finie}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin(kx)}{k^\alpha} \text{ est finie.}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(nx)}{n^\alpha} \text{ C.V.}, \forall x \in]0, 2\pi[.$$

2) or $x \in]0, 2\pi[\Rightarrow \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(nx)}{n^\alpha} \text{ C.V.}$ (d'après

si $x = 2k\pi \Rightarrow \forall n \geq 1, \sin n \cdot 2k\pi = 0$

$$\Rightarrow \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(nx)}{n^\alpha} \text{ C.V.}$$

$\cdot$ si $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}$ tq $x - 2k\pi \in]0, 2\pi[$

$$\Rightarrow \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n(x - 2k\pi))}{n^\alpha} \text{ C.V.} \Leftrightarrow \sum_{n \geq 1} \frac{\sin nx}{n^\alpha} \text{ C.V.}$$

①

$$3) S_x(\pi_2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi_2)}{n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

soit $H_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} \Rightarrow$

on a $\frac{1}{2k+1} = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt \Rightarrow H_n = \int_0^1 \sum_{k=0}^n (-t^2)^k dt$

$$= \int_0^1 \frac{1 - (-t^2)^{n+1}}{1+t^2} dt = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt - (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

$$H_n = \frac{\pi}{4} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

$$\sim \left| (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| \leq \int_0^1 t^{2n+2} dt = \frac{1}{2n+3}$$

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow S_x(\pi_2) = \frac{\pi}{4}$

4) soit $\alpha > 1$

$\forall x \in \mathbb{R}, |S_\alpha(x)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} = O(1) \quad (\alpha > 1, \sum \frac{1}{n^\alpha} < \infty)$

$\Rightarrow S_\alpha$ est bornée sur $\mathbb{R}$.

Partie II

1) $t \mapsto \frac{t^{\alpha-1}}{e^t - u}$ est continue sur $]0, +\infty[\text{ et }]0, +\infty[\subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$

($\forall t \geq 0; e^t \geq 1 > u$)

Pb en ∞ : $\frac{t^{\alpha-1}}{e^t - u} \sim \frac{t^{\alpha-1}}{e^t} = e^{-t} t^{\alpha-1}$

$t^2 e^{-t} t^{\alpha-1} = \frac{t^{\alpha+1}}{e^t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0 \Rightarrow e^{-t} t^{\alpha-1} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$

$\Rightarrow t \mapsto \frac{t^{\alpha-1}}{e^t - u}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

Pb en 0 : $\frac{t^{\alpha-1}}{e^t - u} \sim -\frac{t^{\alpha-1}}{u} = -\frac{1}{u} \frac{1}{t^{1-\alpha}}$ qui est intégrable au v(0) $\Leftrightarrow 1-\alpha < 1 \Leftrightarrow \alpha > 0$

Ainsi $t \mapsto \frac{t^{\alpha-1}}{e^t - u}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ si $\alpha > 0$

2) a) $R_N(t, u) = t^{\alpha-1} \left[\frac{u}{e^t - u} - \sum_{n=1}^{N-1} (u e^{-t})^n \right]$

$$= t^{\alpha-1} \left[\frac{u}{e^t - u} - \frac{u e^{-t} (1 - (u e^{-t})^{N-1})}{1 - u e^{-t}} \right]$$

$$= t^{\alpha-1} \frac{(u e^{-t})^{N-1} (1 - u e^{-t})}{1 - u e^{-t}}$$

b) $\left| \int_0^{+\infty} R_N(t, u) dt \right| \leq \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1} u^{N-1} (e^{-t})^{N-1}}{1 - u e^{-t}} dt$

$$\leq \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1} u^{N-1} (e^{-t})^{N-1}}{e^t - u} dt$$

$$\leq u^{N-1} \cdot \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{e^t - u} dt$$

$\xrightarrow[N \rightarrow +\infty]{} 0$ car $\int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{e^t - u} dt < \infty$

$\Rightarrow \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} R_N(t, u) dt = 0$

b) soit $\alpha > 0$; $t \mapsto t^{\alpha-1} e^{-t}$ est continue et positive sur $]0, +\infty[$.

Pb en 0 : $t^{\alpha-1} e^{-t} \sim t^{\alpha-1} = \frac{1}{t^{1-\alpha}}$ qui est intégrable sur $]0, 1[$ ($1-\alpha < 1$)

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} = 0 \Rightarrow t^{\alpha-1} e^{-t} = o\left(\frac{1}{t}\right)$$

or $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$

$$\Rightarrow t \mapsto t^{\alpha-1} e^{-t}$$

Ainsi: $\forall \alpha > 0$; $t \mapsto t^{\alpha-1} e^{-t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$

D'où l'évaluation de $\Gamma(\alpha)$

$$\int_0^{+\infty} \frac{U t^{\alpha-1}}{e^t - U} dt = \int_0^{+\infty} \frac{U e^{-t} t^{\alpha-1}}{1 - U e^{-t}} dt$$

$$\text{car } |U e^{-t}| \leq |U| < 1; \forall t > 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1 - U e^{-t}} = \sum_{n=0}^{+\infty} (U e^{-t})^n$$

$$\Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{U t^{\alpha-1}}{e^t - U} dt = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} \sum_{n=0}^{+\infty} (U e^{-t})^{n+1} dt$$

$$= \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} (U e^{-t})^n + R_N(t, U) dt$$

$$= \int_0^{+\infty} R_N(t, U) dt + \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} (U e^{-t})^n t^{\alpha-1} dt$$

Puisque $\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} R_N(t, U) dt = 0$, alors

$$\int_0^{+\infty} \frac{U t^{\alpha-1}}{e^t - U} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} U^n e^{-nt} dt$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-nt} dt \right) U^n$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} \frac{dx}{n^\alpha} U^n \quad (3)$$

$$= \Gamma(\alpha) \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{U^n}{n^\alpha}$$

3) La relation (*) est valable pour $U = e^{ix}$

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{ix} t^{\alpha-1}}{e^t - e^{ix}} dt = \Gamma(\alpha) \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{inx}}{n^\alpha}$$

$$\Rightarrow \Gamma(\alpha) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha} = \operatorname{Im} \left(\int_0^{+\infty} \frac{e^{ix} t^{\alpha-1}}{e^t - e^{ix}} dt \right)$$

$$= \operatorname{Im} \left(\int_0^{+\infty} \frac{e^{ix} t^{\alpha-1}}{(e^t - \cos x) + i \sin x} dt \right)$$

$$= \operatorname{Im} \left(\int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1} e^t}{e^t + 1 - 2 \cos x e^t} dt \right)$$

$$= \operatorname{Im} \left(\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1} (e^{ix} - e^{-t})}{e^{-t} + e^t - \cos x} dt \right)$$

$$= \operatorname{Im} \left(\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1} (e^{ix} - e^{-t})}{\cosh t - \cos x} dt \right)$$

$$= \frac{\sin x}{2} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{\cosh t - \cos x} dt$$

$$\Rightarrow S_\alpha(x) = \frac{\sin x}{2 \Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{\cosh t - \cos x} dt$$