

On décompose :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)} = \sum_{k=1}^N \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)} + \sum_{k=N+1}^{+\infty} \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)}$$

Pour avoir $\xi(3)$ à ε près il suffit donc (en négligeant les erreurs d'arrondi) d'avoir $\sum_{k=1}^{N+1} \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)} \leq \varepsilon$ soit $\frac{10}{N^5} + \frac{4}{N^6} \leq 5.10^{-5}$.

La machine à calculer nous dit que la racine positive de $\frac{10}{N^5} + \frac{4}{N^6} = 5.10^{-5}$ est comprise entre 11 et 12. Il suffit donc de prendre $N = 12$ qui donne $\frac{10}{N^5} + \frac{4}{N^6} \leq 4.2.10^{-5}$

$$\xi(3) = \sigma(2) + 3.\sigma(3) + 11.\sigma(4) + \sum_{k=1}^{12} \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)} \pm \varepsilon$$

les 3 premiers termes sont connus:

$$\xi(3) = \frac{1}{4} + 3.\frac{1}{18} + 11.\frac{1}{96} + \sum_{k=1}^{12} \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)} \pm \varepsilon$$

Reste à utiliser sa machine à calculer :

$$\sum_{k=1}^{12} \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)} = 0,6707885152$$

ce qui donne

$$\xi(3) = 1.202038515 \pm 4.2.10^{-5}$$

La valeur obtenue est bien une valeur par défaut car $\sum_{k=1}^{N+1} \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)}$ est un réel positif comme somme de réels positifs.

une valeur approchée de $\xi(3)$ et 1.202038 à 5.10^{-5} par défaut

Partie III : séries factorielles

III.A.1) On a (dénominateur non nul) :

$$\begin{aligned} \frac{w_n(x)}{w_{n-1}(x)} &= n \cdot \frac{1}{x+n} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^x = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x = \left(1 - \frac{x}{n} + \frac{x^2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \left(1 + \frac{x}{n} + \frac{x(x-1)}{2} \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{x(x-1)}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Ce qui donne (les quantités sont positives donc les ln existent)

$$\ln\left(\frac{w_n(x)}{w_{n-1}(x)}\right) = \frac{x(x-1)}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Comme $2 > 1$ la série $\sum \ln\left(\frac{w_n(x)}{w_{n-1}(x)}\right)$ converge absolument.

III.A.2) la série converge. On peut donc noter $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(\frac{w_n(x)}{w_{n-1}(x)}\right)$: On a alors

$$\sum_{n=1}^{+\infty} [\ln(w_n(x)) - \ln(w_{n-1}(x)))] = S(x).$$

et donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln(w_n(x)) - \ln(w_{n-1}(x))) = S(x) + \ln(w_0(x))$$

et donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (w_n(x)) = \exp(S(x))$$

$l(x) = \exp(S(x))$ est bien un réel strictement positif.

III.B) la question précédente nous donne tout de suite un équivalent :

$$|a_n u_n(x)| \sim l(x) |a_n v_n(x)|$$

La série $\sum a_n u_n(x)$ converge absolument si et seulement si la série $\sum l(x) a_n v_n(x)$ converge absolument, ce qui équivaut à la convergence absolue de la série $\sum a_n v_n(x)$.

$\sum a_n u_n(x)$ converge absolument si et seulement si $\sum a_n v_n(x)$ converge absolument

III.C.1) Chaque fonction $a_n u_n$ est continue décroissante positive sur $]0, +\infty[$. De plus la série $\sum a_n u_n(x)$ converge normalement sur tout segment $[\alpha, \beta] \subset]0, +\infty[$ car

$$|a_n u_n(x)| \leq |a_n| u_n(x) \leq |a_n| u_n(\alpha)$$

et comme $\alpha > 0$, $\sum |a_n| u_n(\alpha)$ converge par définition de A .

f_a est donc une somme de série de fonctions continues qui converge normalement sur tout segment inclus dans $]0, +\infty[$

f_a est continue sur $]0, +\infty[$

III.C.2) La majoration $|a_n u_n(x)| \leq |a_n| u_n(\alpha)$ est aussi valable sur $[\alpha, +\infty[$, et donc on a aussi convergence normale sur $[\alpha, +\infty[$. Chaque fonction u_n tend vers 0 si x tend vers $+\infty$ et donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f_a(x)) = 0$$

III.D.1) Si on prend : $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n = \frac{1}{n!}$ on a $n^2 \frac{v_n(x)}{n!} \sim \frac{n^{2-x}}{n!} \rightarrow 0$ et donc $\sum \frac{v_n(x)}{n!}$ converge absolument. Donc d'après III.B.

$$\left(\frac{1}{n!}\right) \in \mathcal{A}$$

III.D.2) Si on prend : $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n = 1$ la série $\sum v_n(x)$ est une série de Riemann qui converge seulement pour $x > 1$

$$(1) \notin \mathcal{A}$$

III.E.1) u_n est l'inverse d'un polynôme n'ayant pas de racine sur $]0, +\infty[$ donc y est de classe C^1 .

Tous les facteurs de u_n sont positifs on peut donc développer $\ln(u_n)$ et dériver l'expression :

$$\ln(u_n(x)) = \ln(n!) - \sum_{k=0}^n \ln(x+k)$$

et donc :

$$\frac{u'_n(x)}{u_n(x)} = - \sum_{k=0}^n \frac{1}{x+k}$$

le sujet suggère de montrer

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{x+k} \leq \ln\left(1 + \frac{n}{x}\right)$$

C'est une comparaison série-intégrale. comme $t \rightarrow 1/t$ décroît sur $\mathbb{R}^{+*}$ (idées du I.B) avec $q = 1$)

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{x+k} \leq \int_x^{x+n} \frac{dt}{t} = \ln(x+n) - \ln(x)$$

$$\forall x > 0, |u'_n(x)| \leq u_n(x) \left(\frac{1}{x} + \ln\left(1 + \frac{n}{x}\right) \right)$$

III.E.2) On sait déjà que pour tout n , la fonction $x \mapsto a_n u_n(x)$ est C^1 sur $]0, +\infty[$ et que $\sum a_n u_n(x)$ converge simplement sur ce domaine.

Pour pouvoir dire que la somme est C^1 et pouvoir dériver termes à termes il reste à prouver la convergence normale sur tout segment $[\alpha, \beta] \subset]0, +\infty[$ de $\sum a_n u'_n(x)$.

Or

$$|a_n u'_n(x)| \leq |a_n| u_n(x) \left(\frac{1}{x} + \ln\left(1 + \frac{n}{x}\right) \right) \leq |a_n| u_n(\alpha) \left(\frac{1}{\alpha} + \ln\left(1 + \frac{n}{\alpha}\right) \right)$$

Or $\sum |a_n| u_n(\alpha)$ converge. Il suffit de prouver la convergence de $\sum |a_n| u_n(\alpha) \ln\left(1 + \frac{n}{\alpha}\right)$

Comme

$$\ln\left(1 + \frac{n}{\alpha}\right) = \ln(n) + \ln\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{\alpha}\right) = \ln(n) + O(1) \sim \ln(n)$$

on se ramène à l'étude de $\sum |a_n| u_n(\alpha) \ln(n)$. On prend $\alpha' \in]0, \alpha[$. Comme $\alpha' > 0$, $\sum |a_n| u_n(\alpha')$ converge.

Mais

$$|a_n| u_n(\alpha) \ln(n) = (|a_n| u_n(\alpha')) \frac{u_n(\alpha) \ln(n)}{u_n(\alpha')} \sim (|a_n| u_n(\alpha')) \frac{l(\alpha')}{l(\alpha)} \frac{(n+1)^{\alpha'} \ln(n)}{(n+1)^{\alpha}}$$

et comme

$$\lim \left(\frac{\ln(n)}{(n+1)^{\alpha-\alpha'}} \right) = 0$$

on a :

$$|a_n| u_n(\alpha) \ln(n) << |a_n| u_n(\alpha')$$

ce qui assure la convergence absolue de la série $\sum |a_n| u_n(\alpha) \ln(n)$

$$f_\alpha \text{ est } C^1 \text{ sur } [0, +\infty[$$

Partie 4 : représentation intégrale

IV.A.1) On a $n+1$ polynômes dans un espace vectoriel de dimension $n+1$. Il suffit de montrer que la famille est libre.

Or si on prend une famille $(\lambda_k)_{k=0}^n$ telle que $\sum \lambda_k P_k = 0$ la valeur en $-j$ donne

$$P_k(-j) = \prod_{i \neq k} (-j+i) \begin{cases} 0 & \text{si } j \neq k \\ \prod_{i \neq j} (-j+i) \neq 0 & \text{si } j = k \end{cases} \text{ et donc :}$$

$$\sum \lambda_k P_k = 0 \Rightarrow \forall j \in [[0, n]], \lambda_j \prod_{i \neq j} (i-j) = 0$$

$$\Rightarrow \forall j \in [[0, n]], \lambda_j = 0$$

la famille est donc libre et forme donc une base de $\mathbb{R}_n[X]$

IV.A.2) le polynôme $n!$ se décompose donc dans cette base : $\exists (\alpha_k)_{k=0}^n, n! = \sum_{k=0}^n \alpha_k P_k$. on divise la relation par $\prod_{i=0}^n (X+i)$ et on a bien :

$$\frac{n!}{X(X+1)\cdots(X+n)} = \sum_{k=0}^n \frac{\alpha_k}{X+k}$$

On substitue x à X pour avoir la relation demandée.

Pour calculer les α_k on prend la valeur en $-j$ de $n! = \sum_{k=0}^n \alpha_k P_k$ ce qui donne $n! = \alpha_j \prod_{i \neq j} (i-j)$.

Or $\prod_{i \neq j} (i-j) = (0-j)(1-j)\cdots(-1)(1)\cdots(n-j) = (-1)^j (j)!(n-j)!$ d'où

$$\forall j \in [[0, n]], \alpha_j = (-1)^j \binom{n}{j}$$

et donc :

$$\forall x > 0, \frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \binom{n}{k}}{x+k}$$

IV.B) la fonction $y \mapsto (1-y)^{x-1+k}$ est continue sur $[0, 1[$ du type $\frac{1}{(1-y)^{1-x-k}}$ avec $1-x-k < 1$. Elle est donc intégrable sur $[0, 1[$ et :

$$\int_0^1 (1-y)^{x-1+k} dy = \frac{-(1-y)^{x+k}}{x+k}$$

et donc comme $x+k > 0$:

$$\forall x > 0, \forall k \in \mathbb{N}, \int_0^1 (1-y)^{x-1+k} dy = \frac{1}{x+k}$$

IV.C) l'intégrale est bien convergente : $y \mapsto (1-y)^{x-1} y^n$ est continue positive sur $[0, 1[$, équivalente en 1 à $\frac{1}{(1-y)^{1-x}}$ avec $1-x < 1$

En utilisant les deux résultats précédents et le binôme de Newton on a :

$$\begin{aligned} \frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)} &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \binom{n}{k}}{x+k} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \int_0^1 (1-y)^{x-1+k} dy \\ &= \int_0^1 (1-y)^{x-1} \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (1-y)^k \right) dy \\ &= \int_0^1 (1-y)^{x-1} y^n dy \end{aligned}$$

La fonction $y \mapsto (1-y)^{x-1} y^n$ étant bien intégrable comme combinaison linéaire de fonctions intégrables.

Il suffit de remplacer $u_n(x)$ par son expression intégrale pour conclure :

$$\forall x > 0, f_a(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \int_0^1 (1-y)^{x-1} y^n dy$$

IV.D.1) Comme $a \in \mathcal{A}$, la série $\sum a_n u_n(x)$ converge absolument pour tout $x > 0$. En particulier si $x = 1$, la série $\sum \frac{a_n}{n+1}$ converge. La série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ converge pour $x = 1$, donc son rayon de convergence est supérieur ou égal à 1.

Sa dérivée $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n a_n}{n+1} x^{n-1}$ a le même rayon de convergence. Donc $|x| < 1 \Rightarrow \sum \frac{n a_n}{n+1} x^{n-1}$ converge absolument $\Rightarrow \sum \frac{n a_n}{n+1} x^n$ converge absolument (on multiplie par x).

Et comme $\left| \frac{n a_n}{n+1} x^n \right| \sim_{n \rightarrow +\infty} |a_n x^n|$ la série $\sum a_n x^n$ converge au moins pour $|x| < 1$. Son rayon de convergence est donc au moins 1.

IV.D.2) On a :

$$\forall x > 0, \int_0^1 (1-y)^{x-1} \phi_a(y) dy = \int_0^1 (1-y)^{x-1} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n y^n dy$$

Si on peut intégrer termes à termes on a :

$$\forall x > 0, \int_0^1 (1-y)^{x-1} \phi_a(y) dy = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \int_0^1 (1-y)^{x-1} y^n dy = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n u_n(x)$$

donc $x \mapsto \int_0^1 (1-y)^{x-1} \phi_a(y) dy$ est développable en série factorielle, et la fonction est égale à f_a d'après IV.C)

Reste à justifier l'intégration termes à termes de $\int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (1-y)^{x-1} y^n dy$ sur l'intervalle $[0, 1[$ (qui n'est pas un segment)
On se fixe un $x > 0$

- $\forall n \in \mathbb{N}, y \mapsto a_n (1-y)^{x-1} y^n$ est continue intégrable sur $[0, 1[$ d'après IV.C
- $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (1-y)^{x-1} y^n$ converge simplement et sa somme $(1-y)^{x-1} \phi_a(y)$ est continue sur $[0, 1[$ (une série entière est continue sur l'intervalle ouvert de convergence)
- $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 |a_n (1-y)^{x-1} y^n| dy = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| \int_0^1 (1-y)^{x-1} y^n dy = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| u_n(x)$. Cette série est bien convergente puisque $a \in \mathcal{A}$.

$$\forall x > 0, y \mapsto (1-y)^{x-1} \phi_a(y) \text{ est intégrable sur } [0, 1[\text{ et } f_a(x) = \int_0^1 (1-y)^{x-1} \phi_a(y) dy$$

Partie V : Dérivée d'une série factorielle

V.A.1) On sait déjà que f_a est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ (question III.E). pour avoir l'expression proposée il faut dériver par rapport à x la fonction $\int_0^1 (1-y)^{x-1} \phi_a(y) dy$ en utilisant le théorème de Leibniz.

- $\forall y \in [0, 1[, x \mapsto (1-y)^{x-1} \phi_a(y)$ est C^1 sur $]0, 1[$ de dérivée $x \mapsto (1-y)^{x-1} \phi_a(y) \ln(1-y)$
- $\forall x > 0, y \mapsto (1-y)^{x-1} \phi_a(y)$ est intégrable sur $[0, 1[$ (question IV.D)
- $\forall x > 0, y \mapsto (1-y)^{x-1} \phi_a(y) \ln(1-y)$ est intégrable sur $[0, 1[$: même principe que III.E:

pour $x' \in]0, x[$ $(1-y)^{x-1} \phi_a(y) \ln(1-y) = o_{y \rightarrow 1} \left[(1-y)^{x'-1} \phi_a(y) \right]$ puisque

$$(1-y)^{x-1} \phi_a(y) \ln(1-y) = (1-y)^{x'-1} \phi_a(y) \cdot \left[(1-y)^{x-x'} \ln(1-y) \right]$$

$y \mapsto (1-y)^{x-1} \phi_a(y) \ln(1-y)$ est continue sur $[0, 1[$ négligeable devant une fonction intégrable, donc y est intégrable.

- Par monotonie, on a domination sur tout segment : si $x \in [\alpha, \beta] \subset]0, +\infty[$

$$|(1-y)^{x-1} \phi_a(y) \ln(1-y)| \leq (1-y)^{\alpha-1} |\phi_a(y)| |\ln(1-y)|$$

ce majorant étant intégrable puisque $\alpha > 0$ et donc $(1-y)^{\alpha-1} \phi_a(y) \ln(1-y)$ est intégrable sur $[0, 1[$ (étude du point précédent)

$$\forall x > 0, f'_a(x) = \int_0^1 (1-y)^{x-1} \phi_a(y) \ln(1-y) dy$$

V.A.2) On sait que ϕ_a et $y - \ln(1-y)$ sont développables en série entière sur $] -1, 1[$. Donc par produit de Cauchy $y - \phi_a(y) \ln(1-y)$ l'est aussi.

V.A.3) La fonction étant développable en série entière, on sait que sur $] -1, 1[$

$$\psi_a(y) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\psi_a^{(n)}(0)}{n!} y^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n y^n$$

Le calcul des b_n revient donc au produit de Cauchy de $\phi_a(y) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n y^n$ par $\ln(1-y) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n y^n$ avec $\alpha_n =$

$$\begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ \frac{-1}{n} & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

On a donc $b_0 = a_0 \alpha_0 = 0$ et pour $n > 0$, $b_n = \sum_{p=0}^n a_p \alpha_{n-p} = \sum_{p=0}^{n-1} \frac{-a_p}{n-p}$

$$\forall y \in] -1, 1[, \phi_a(y) \ln(1-y) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n y^n \text{ avec } b_n = \sum_{p=0}^{n-1} \frac{-a_p}{n-p}$$

V.B) D'après l'expression précédente de b_n on a :

$$|b_n| \leq \sum_{p=0}^{n-1} \frac{|a_p|}{n-p}$$

et donc :

$$\sum_{n=1}^N \frac{|b_n|}{(n+1)^x} \leq \sum_{n=1}^N \left(\sum_{p=0}^{n-1} \frac{|a_p|}{(n-p)(n+1)^x} \right)$$

On veut permuter les 2 sommes : On fait la somme sur l'ensemble des couples (n, p) tels que $\begin{cases} 1 \leq n \leq N \\ \forall n, 0 \leq p \leq n-1 \end{cases}$ soit $0 \leq p \leq n-1 \leq N-1$ ou encore $\begin{cases} 0 \leq p \leq N-1 \\ \forall p, p+1 \leq n \leq N \end{cases}$ et donc :

$$\sum_{n=1}^N \frac{|b_n|}{(n+1)^x} \leq \sum_{p=0}^{N-1} |a_p| \sum_{n=p+1}^N \frac{1}{(n-p)(n+1)^x} = \sum_{p=0}^{N-1} |a_p| \sum_{k=1}^{N-p} \frac{1}{(k)(k+p+1)^x}$$

en posant $k = n - p$.

V.C) Encore une comparaison série-intégrale : La fonction $t \rightarrow t(t+p+1)^x$ est le produit de deux fonctions croissantes ($x > 0$) positive donc est croissante positive et donc $t \rightarrow \frac{1}{t(t+p+1)^x}$ est décroissante. Pour $k \geq 2$ on a donc

$$\frac{1}{k(k+p+1)^x} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t(t+p+1)^x}$$

et donc

$$\sum_{k=2}^{N-p} \frac{1}{k(k+p+1)^x} \leq \int_1^{N-p} \frac{dt}{t(t+p+1)^x}$$

L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t(t+p+1)^x}$ converge car $\frac{1}{t(t+p+1)^x} \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^{x+1}}$ fonction positive avec $x+1 > 1$. La fonction à intégrer étant positive, sa primitive est croissante. et donc la limite en $+\infty$ est la borne supérieure:

$$\sum_{k=2}^{N-p} \frac{1}{k(k+p+1)^x} \leq \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t(t+p+1)^x}$$

On ajoute alors le premier terme:

$$\sum_{k=1}^{N-p} \frac{1}{k(k+p+1)^x} \leq \frac{1}{(p+1)^x} + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t(t+p+1)^x}$$

V.D) Il suffit de majorer :

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t(t+p+1)^x} \leq \frac{\ln(p+1)}{(p+1)^x} + \frac{1}{x} \frac{1}{(p+1)^x}$$

Pour avoir les 2 morceaux, on sépare en deux l'intégrale:

$$\int_1^{p+1} \frac{dt}{t(t+p+1)^x} \leq \int_1^{p+1} \frac{dt}{t(p+1)^x} = \frac{\ln(p+1)}{(p+1)^x}$$

et

$$\int_{p+1}^{+\infty} \frac{dt}{t(t+p+1)^x} \leq \int_{p+1}^{+\infty} \frac{dt}{t(t)^x} = \int_{p+1}^{+\infty} \frac{dt}{t^{x+1}} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{(p+1)^x}$$

et donc

$$\sum_{k=1}^{N-p} \frac{1}{k(k+p+1)^x} \leq \frac{\ln(p+1)}{(p+1)^x} + \left(1 + \frac{1}{x}\right) \frac{1}{(p+1)^x}$$

V.E) La suite des sommes partielles $\sum_{n=1}^N \frac{|b_n|}{(n+1)^x}$ est croissante majorée par la suite des sommes partielles :

$$\sum_{p=0}^{n-1} |a_p| \cdot \left(\frac{\ln(p+1)}{(p+1)^x} + \left(1 + \frac{1}{x}\right) \frac{1}{(p+1)^x} \right)$$

Il suffit donc de prouver que la série $\sum |a_p| \cdot \left(\frac{\ln(p+1)}{(p+1)^x} + \left(1 + \frac{1}{x}\right) \frac{1}{(p+1)^x} \right)$ converge

Comme la suite $a \in \mathcal{A}$ on sait par l'équivalent du III.A) que la série $\sum |a_n| \frac{1}{(n+1)^x}$ converge pour tout $x > 0$.

Ce qui assure déjà la convergence de la série $\sum_p |a_p| \frac{1}{(p+1)^x}$ donc de $\sum_p \left(1 + \frac{1}{x}\right) |a_p| \frac{1}{(p+1)^x}$

Pour la convergence absolue de $\sum |a_p| \cdot \frac{\ln(p+1)}{(p+1)^x}$ on introduit (encore une fois) $x' \in]0, x[$ et on vérifie que

$$|a_p| \cdot \frac{\ln(p+1)}{(p+1)^x} = o_{p \rightarrow +\infty} \left(\frac{|a_p|}{(1+p)^{x'}} \right)$$

La série $\sum \frac{b_n}{(n+1)^x}$ converge absolument sur $]0, +\infty[$

V.F) Ce qui assure avec III.A) la convergence absolue de la série $\sum b_n u_n(x)$ sur $]0, +\infty[$

On applique maintenant IV.D) à ψ_a :

$\psi_a(y) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n y^n$ est une série entière de rayon de convergence ≥ 1 donc $x \rightarrow \int_0^1 (1-y)^{x-1} \psi_a(y) dy$ est développable en série factorielle et $\int_0^1 (1-y)^{x-1} \psi_a(y) dy = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n u_n(x)$.

Or (V.A) $f'_a(x) = \int_0^1 (1-y)^{x-1} \psi_a(y) dy$ et donc :

$$\forall x > 0, f'_a(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n u_n(x)$$

V.G)

$$x > 0, \frac{1}{x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{+\infty} 0 \cdot u_n(x)$$

donc $x \rightarrow 1/x$ est développable en série factorielle avec $a_0 = 1$ et $\forall n \geq 1, a_n = 0$

On dérive une fois : $f'(x) = \frac{-1}{x^2}$ est développable en série factorielle :

$$\forall x > 0, \frac{-1}{x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} a'_n u_n(x)$$

avec $a'_0 = 0$ et $\forall n \geq 1, a'_n = -\sum_{p=0}^{n-1} \frac{a_p}{n-p} = -\frac{1}{n}$

$$\forall x > 0, \frac{-1}{x^2} = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{u_n(x)}{n}$$

On dérive une nouvelle fois : $f''(x) = \frac{2}{x^3}$ est développable en série de factorielle:

$$\forall x > 0, \frac{2}{x^3} = \sum_{n=0}^{+\infty} a''_n u_n(x)$$

avec $a''_0 = 0, a''_1 = a'_0 = 0, \forall n \geq 2, a''_n = -\sum_{p=0}^{n-1} \frac{a'_p}{n-p} = \sum_{p=1}^{n-1} \frac{1}{p(n-p)}$. En particulier : $a''_2 = a''_3 = 1, a''_4 = \frac{11}{12}$

Ce qui donne la somme partielle

$$S_4 = \sum_{n=0}^4 a''_n u_n(x) = 1 \cdot \frac{2}{x(x+1)(x+2)} + 1 \cdot \frac{6}{x(x+1)(x+2)(x+3)} + \frac{11}{12} \frac{24}{x(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)}$$

en divisant par 2 (on décompose $2/x^3$) on retrouve bien les coefficients, 1,3,11 de la partie 2