

PARTIE II – STRUCTURE DE L'ATMOSPHERE TERRESTRE ET STRUCTURE DU SOLEIL.

L'atmosphère est essentiellement constituée d'un mélange gazeux, l'air. Ce mélange comprend surtout de l'azote (78 % en volume) et de l'oxygène (21 %). Pour le reste, soit 1 % on y trouve de l'argon (~ 1 %), du gaz carbonique (0,03 %) et des traces infimes d'une multitude d'autres gaz : néon, krypton, hélium, ozone, hydrogène, xénon ainsi que les différents rejets de la biosphère. Cette composition est assez constante jusqu'à 85 kilomètres d'altitude sauf pour certains gaz, par exemple l'ozone, qui est surtout présent entre 30 et 40 kilomètres d'altitude.

L'atmosphère est stratifiée en température (et donc également en pression), ainsi qu'on l'observe sur la figure ci-dessous. La remontée en température dans la stratosphère s'explique par l'absorption des rayons solaires due à l'ozone.




Fig.1. Température de l'air en fonction de l'altitude.

En plus de ces gaz, on trouve des proportions variables de vapeur d'eau (rarement plus de 5 % du total de l'air humide). Cette quantité est proportionnelle à la température, ce qui explique le phénomène de condensation (pluie, brouillard, neige) de l'air chaud humide qui a tendance à s'élever donc à se refroidir. On néglige ce phénomène dans les différentes modélisations suivantes, qui ne concerneront donc que l'air sec.

II.1.- Questions préliminaires.

On considère que l'air suit la loi des gaz parfaits :

$$PV = RT \quad \text{pour une mole}$$

II.1.1. En faisant appel aux connaissances sur les gaz parfaits, vérifier que : $R = 8,32 \text{ S.I.}$

II.1.2. Montrer qu'à partir de la composition de l'air, la masse molaire de l'air vaut $M = 29 \text{ g/mole}$. La masse molaire de l'argon est 40 g/mole , celles de l'oxygène et de l'azote sont supposées connues.

II.1.3. La loi des gaz parfaits peut s'écrire :

$$P = \frac{\rho}{M} \cdot RT$$

Donner la définition de ρ .

II.1.4. Justifier que l'équilibre hydrostatique peut s'écrire :

$$dP = -\rho g dz \quad \text{et définir } g.$$

Pour la suite, on supposera g uniforme et on prendra : $g = 9,81 \text{ SI}$.

II.2.- Atmosphère isotherme.

II.2.1. Etablir l'équation barométrique :

$$P(z) = P(0) \cdot e^{\frac{-Mgz}{RT}}$$

Soit $n = n(z)$ la densité volumique de molécules à l'altitude z .

II.2.2. Montrer que l'on peut écrire la loi des gaz parfaits sous la forme :

$$P = nkT \quad \text{où } k = R/\mathcal{N} \quad \mathcal{N} \text{ est le nombre d'Avogadro}$$

II.2.3. Montrer que l'on obtient l'équation du nivellement barométrique suivante :

$$n(z) = n(0) e^{\frac{-E(z)}{kT}}$$

Quelle est la signification physique de $E(z)$?

Il est intéressant de noter que cette expression a conduit Boltzmann sur le chemin de la thermodynamique statistique classique et que la constante k porte son nom.

II.2.4. Quelle est la signification physique de kT ?

II.2.5. Calculer le rapport $P(z)/P(0)$ à 10 000 mètres dans une atmosphère isotherme à $T = 288 \text{ K}$.

II.2.6. Montrer que 70 % de la masse totale de l'air est située en dessous de 10 000 mètres pour une atmosphère isotherme à $T = 288 \text{ K}$.

II.3.- Atmosphère adiabatique et allotropique.

L'air suit toujours la loi des gaz parfaits, mais il est maintenant le siège de phénomènes adiabatiques réversibles suivant la loi :

$$PV^\gamma = \text{constante}$$

II.3.1. Sachant que pour un gaz diatomique les capacités thermiques molaires sont telles que :

$$C_p = \frac{7}{2} R \quad \text{et} \quad C_v = \frac{5}{2} R, \quad \text{exprimer le coefficient } \gamma.$$

II.3.2. Etablir l'équation des adiabatiques réversibles $T^\gamma \cdot P^\gamma = \text{constante}$, en fonction de γ .

II.3.3. Etablir la relation donnant $\frac{dT}{T}$ en fonction de $\frac{dP}{P}$

II.3.4. Etablir l'expression du gradient de température adiabatique $\left(\frac{dT}{dz}\right)_{\text{adia}}$, en fonction de γ , M , g et R ; calculer sa valeur pour l'air.

II.3.5. "Mesdames et Messieurs, le commandant est heureux de vous accueillir à bord. Notre montée est maintenant terminée et nous volons actuellement à 10 000 m. La température extérieure est de $x^\circ\text{C}$. Il faisait 15°C à notre départ ... etc "

A partir de la figure, donner la valeur de x et du gradient de température réel $\left(\frac{dT}{dz}\right)_{\text{réel}}$ et le comparer au gradient adiabatique.

Les transformations réelles au sein de l'atmosphère ne sont ni isothermes ($PV = \text{constante}$), ni strictement adiabatiques ($PV^\gamma = \text{constante}$), mais se situent entre les deux. On les dit allotropiques :

$$PV^q = \text{constante}, \quad 1 < q < \gamma.$$

II.3.6. Donner la valeur de q à partir des valeurs lues sur la figure.

II.3.7. Donner la distribution réelle de température $T(z)$.

II.3.8. Donner la distribution réelle de pression $P(z)$.

II.3.9. Calculer T et P à 10 000 m.

II.3.10. Qu'appelle-t-on maladie de l'altitude ? Pourquoi les athlètes s'entraînent-ils en altitude ? Pourquoi tente-t-on d'établir des records de vitesse sur piste à Mexico ?

II.4.- Le critère de Schwarzschild

On sait par expérience qu'un fluide, et plus particulièrement l'atmosphère, en équilibre hydrostatique, est stratifié : ceci veut dire qu'il existe suivant la verticale un gradient de pression et un gradient de température.

Pour l'atmosphère terrestre, la sollicitation thermique provient de l'énergie radiative solaire et la sollicitation mécanique est associée au champ de gravitation.

Se pose alors la question de la mise en mouvement d'un tel fluide et c'est pour y répondre que Schwarzschild, s'inspirant des résultats précédents, a formulé son critère :

"La convection apparaît dans un fluide en équilibre hydrostatique si le gradient de température réel devient inférieur au gradient de température adiabatique"

$$\left(\frac{dT}{dz}\right)_{\text{adia}} > \left(\frac{dT}{dz}\right)_{\text{réel}}$$

Schwarzschild a établi ce critère en vue de comprendre la structure interne du soleil.

Soit donc un fluide en équilibre hydrostatique, sous l'action de la pesanteur, tel que :

$$dP = -\rho g dz$$

On notera P , T et ρ les pression, température et masse volumique du fluide.

Un petit élément de volume dV , de section horizontale dS et d'épaisseur dz , initialement à l'altitude z , se déplace verticalement de la quantité δz . Il se met immédiatement en équilibre de pression avec le milieu ambiant à l'altitude $z + \delta z$. Il subit donc une détente ou une compression adiabatiques. Sa masse volumique et sa température notées respectivement ρ_1 et T_1 , sont différentes du fluide ambiant qui n'est plus en équilibre adiabatique.

II.4.1. Montrer que l'équation du mouvement est :

$$\delta \ddot{z} = \frac{\delta \rho}{\rho_1} \cdot g \quad \text{où} \quad \delta \ddot{z} = \frac{\delta^2 z}{\delta t^2} \quad \text{et} \quad \delta \rho = \rho - \rho_1$$

II.4.2. Montrer que l'on peut écrire au premier ordre :

$$\delta \ddot{z} = \alpha g [T_1 - T(z + \delta z)] \quad \text{où} \quad \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

II.4.3. En déduire le critère de Schwarzschild.

L'étude du mouvement des planètes autour du soleil permet d'assigner à ce dernier une masse $M_s = 2 \cdot 10^{30}$ kg, ainsi que de déterminer la distance terre-soleil $a = 150$ millions de kilomètres.

Le disque solaire ou photosphère possède une température de 5 800 K en accord avec la loi du maximum d'émission du corps noir, qui correspond à une longueur d'onde λ_m située au centre du spectre visible (chlorophylle), conformément à :

$$\lambda_m \cdot T = 2898 \quad \text{avec } \lambda_m \text{ en } \mu\text{m} \text{ et } T \text{ en K.}$$

II.4.4. Calculer λ_m

De la terre, le disque solaire est vu sous un angle de 32' (c'est-à-dire 32 minutes d'arc).

II.4.5. Donner la valeur du rayon solaire R_s et calculer la masse volumique moyenne ρ_s du soleil.

Soit $M(r)$ la masse contenue dans une sphère de centre O et de rayon r et soit $\rho(r)$ la masse volumique en r .

II.4.6. Etablir la relation : $\frac{dP}{dr} = -G \frac{M(r) \cdot \rho(r)}{r^2}$ où $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ SI est la constante de gravitation universelle.

II.4.7. Calculer la pression au cœur du soleil P_{cs} en identifiant :

$$\frac{P_{cs}}{R_s} \sim \frac{dP}{dr}$$

On considère que la matière qui constitue le soleil est un gaz parfait d'hydrogène ionisé, composé de protons H^+ et d'électrons e^- . Il y a donc deux particules et la masse molaire moyenne est $\mu = 5 \cdot 10^{-4}$ kg/mole ; l'équation d'état du soleil s'écrit :

$$P(r) = \frac{\rho(r)}{\mu} \cdot R \cdot T(r)$$

II.4.8. Calculer la température au cœur du soleil T_{cs} . Il est à noter que c'est à cause des valeurs très élevées de T_{cs} et de P_{cs} que les atomes légers d'hydrogène entrent en collision avec une telle violence qu'ils parviennent à surmonter la répulsion coulombienne pour fusionner en un noyau plus lourd : l'hélium, synonyme de soleil. Calculer le gradient réel de température.

II.4.9. Exprimer le gradient de température adiabatique à la distance r du centre du soleil en fonction de $M(r)$.

II.4.10. En supposant que pratiquement toute la masse du soleil est concentrée à l'origine, trouver à quelle distance r_c du centre doit apparaître la convection naturelle. On prendra $\gamma = \frac{5}{3}$, valeur du gaz monoatomique.

Fin de l'énoncé